

# Обезболивающая жидкость Vantelin

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** обезболивающая жидкость

2. **Характеристики**

Состав: вода, вспомогательные вещества, L-ментол, индометацин  
Вспомогательные вещества: стирол-изопрен-стирольный  
блок-сополимер, терпеновая смола, синтетический сквалан, жидкий  
парафин, изостеариновая кислота, тальк, ментол, ВНТ  
Возрастное ограничение: старше 11 лет  
Вес: 90 г  
Размеры упаковки: 160 x 43 x 55 мм  
Вес в упаковке: 147 г  
Страна: Япония



### 3. Показания к применению

- Боли в спине при воспалительных и дегенеративных заболеваниях позвоночника (радикулит, остеоартроз и т.д.).
- Боли в суставах при ревматоидном артрите, остеоартрозе.
- Боли в мышцах (вследствие растяжений, перенапряжений, ушибов и травм).
- Воспаление и отечность мягких тканей и суставов вследствие травм и при ревматических заболеваниях (тендовагинит, бурсит, поражения периартикулярных тканей).

### 4. Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; склонность к возникновению приступов бронхиальной астмы, кожных высыпаний или острых ринитов при применении ацетилсалициловой кислоты или других НПВП; беременность; грудное вскармливание; детский возраст (до 11 лет); нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения.

С осторожностью: печеночная порфирия (обострение), эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, тяжелые нарушения функции печени и почек, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма, пожилой возраст.

Использовать не более 4 раз в день.

### 5. Способ применения

1. Снимите колпачок и опустите губку на болезненный участок.
2. Выдавите жидкость на болезненную область и дайте раствору впитаться.
3. Наносите непосредственно на болезненный участок. Повторите 2–3 раза.



## 6. Комплектация

- Обезболивающая жидкость Vantelin
- Документация