

C3+ Complex

Инструкция



Состав: куркуминоиды (куркумин 75–81%, деметоксикуркумин 15–19% и бис-деметоксикуркумин 2,2–6,5%, биоперин, связующие элементы).

Форма выпуска: 60 таблеток. Одна таблетка содержит 950 мг препарата, при необходимости делится на две части.

Способ применения:

Препарат рекомендован людям старше 25 лет. Принимать внутрь ежедневно после еды, не разжевывая и запивая водой. Рекомендуемая дозировка для первых трех недель применения составляет 1–1,5 таблетки в зависимости от массы тела (при весе до 65 кг — 2 раза в день по ½ таблетки, более 65 кг — 3 раза в день по ½ таблетки).

После трех недель приема для усиления благоприятного эффекта рекомендуется увеличить дозировку. При весе менее 65 кг — 3 раза в день по ½ таблетки, более 65 кг — 2 раза в день по 1 таблетке**.

Использование препарата для профилактики похмельного синдрома

При весе до 65 кг — ½ таблетки за 30 минут до употребления алкоголя, более 65 кг — 1 таблетку за 30 минут до употребления алкоголя. Профилактический прием возможен как дополнение при курсовом приеме препарата, так и отдельно.

Особые указания:

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться со специалистом в следующих случаях:

- нарушения свертываемости крови и прием антикоагулянтов;
- желчнокаменная болезнь;
- острые стадии гастрита, язвенной болезни, панкреатита;



- беременность и лактация;
- период подготовки к хирургическим операциям;
- индивидуальная повышенная чувствительность к черному перцу.

Условия хранения:

Хранить в прохладном сухом месте. Беречь от детей.

Страна-производитель: Индия

Страна-разработчик: США, Индия.

Дополнительная информация: Препарат запатентован US & International Patents. Curcumin C3 Complex®&Bioperin® являются зарегистрированными товарными знаками Sabinsa Corporation & Sami Labs Limited.

**Не является лекарственным средством. Не имеет противопоказаний.
Подходит вегетарианцам и веганам.**

* Если один из приемов препарата был пропущен, можно принять всю дневную дозировку за один раз.

** Увеличение дозировки сверх рекомендованной возможно только после консультации со специалистом.